


# Instructies voor patiënten met blaaskanker



## Vóór de blaasspoeling

Voor de spoeling controleren we uw urine bij het laboratorium. Dit mag géén ochtendurine zijn. Drink 4 uur voor de blaasspoeling niet of weinig. Gebruikt u plastabletten? Neem deze pas 2 uur na de spoeling in.

## Na de blaasspoeling

De spoeling moet het liefst 2 uur in de blaas blijven, maar minimaal 1 uur. Drink veel nadat u de spoeling heeft uitgeplast.

### 🔴 Bij morsen van de blaasspoeling

*Blaasspoeling met BCG:*

*Bij contact met de huid zo snel mogelijk ruim spoelen met water. Maak de huid daarna schoon met verdunde chloor. Maak ook de omgeving schoon met chloor.*

*Blaasspoeling met mitomycine:*

*Bij contact met de huid zo snel mogelijk ruim spoelen met water. Maak de huid daarna schoon met (pH-neutrale) zeep. Maak ook de omgeving schoon met pH-neutrale zeep.*

## En verder dit:



### Drinken

Drink nadat u de spoeling heeft uitgeplast minstens 6-8 glazen water, koffie, thee of limonade.




### Bij koorts

Heeft u na de blaasspoeling koorts boven de 38.5 °C? Neem dan contact op met de afdeling urologie.



### Toilet

Plas zittend. Spoel het toilet 2 keer door met de deksel dicht.



### Geslachtsgemeenschap

Bij BCG: de eerste 7 dagen met condoom.  
Bij mitomycine: de eerste 48 uur met condoom.

Meer informatie over blaaskanker: [www.kanker.nl/blaaskanker](http://www.kanker.nl/blaaskanker)