

Cijfers over de gevolgen van eierstokkanker

Eierstokkanker en de behandeling ervan kunnen zowel lichamelijke als emotionele gevolgen hebben. Waar iemand last van krijgt, is moeilijk te zeggen. Dat kan voor iedere patiënt anders zijn.

Op deze pagina lees je hoeveel procent van de vrouwen last heeft van bepaalde gevolgen na de behandeling. Een behandeling bestaat vaak uit een operatie, of een operatie en chemotherapie.

Lichamelijke en mentale gezondheid

Meer dan 4 op de 10 vrouwen heeft last van vermoeidheid na de behandeling. Minder vrouwen hebben last van neuropathie, angstklachten en sombere gevoelens.

Ernstige vermoeidheid, neuropathie en angstklachten komen ook voor bij vrouwen die geen kanker hebben gehad, maar minder. Ze hebben wel even vaak last van sombere gevoelens.

Figuur 1: Fysieke en mentale gezondheid



Intimiteit en seksualiteit

Ongeveer 6 op de 10 vrouwen zegt geen zin in seks hebben. Van de vrouwen die geen kanker hebben gehad en dezelfde leeftijd hebben, zegt ongeveer 4 op de 10 dat ze geen zin in seks hebben. Dat is een verschil van ongeveer 20%.

Van de vrouwen die eierstokkanker hebben gehad en wel seks hebben, heeft iets meer dan 4 op de 10 geen plezier in seks. De meeste vrouwen die geen kanker hebben gehad en wel seks hebben, hebben wel plezier in seks.

Figuur 2: Intimiteit en seksualiteit



Belemmeringen in het functioneren

Ongeveer 1 op de 3 vrouwen ervaart problemen in de dagelijkse bezigheden zoals (vrijwilligers)werk en hobby's. En 1 op de 5 vrouwen ervaart problemen in haar sociale leven.

1 op de 6 vrouwen heeft last van problemen met denken na de behandeling, zoals iets onthouden of je aandacht ergens bij houden (cognitieve problemen). Vrouwen die geen kanker hebben gehad, hebben minder vaak last van deze problemen.

Figuur 3: Belemmeringen functioneren



Gevolgen naar type behandeling


Welke behandeling iemand heeft gehad, heeft invloed op de gevolgen die iemand ervaart. Vooraf is niet te voorspellen of iemand ook echt last gaat krijgen van een bepaald gevolg.

Na een operatie en chemotherapie hebben meer vrouwen klachten dan wanneer de behandeling alleen uit een operatie bestaat.

Iets meer dan een kwart van de vrouwen heeft last van vermoeidheid na een operatie. Na een operatie en chemotherapie heeft bijna de helft van de vrouwen last van vermoeidheidsklachten.

Voor neuropathie en problemen bij dagelijkse bezigheden geldt ook dat de vrouwen na een operatie en chemotherapie meer klachten hebben dan na alleen een operatie.

Figuur 4: Gevolgen naar type behandeling




Gevolgen naar tijd sinds diagnose

In de eerste twee jaar na diagnose hebben vrouwen het vaakst last van de gevolgen. Een aantal vrouwen blijft langer klachten houden.

Meer dan 1 op de 5 vrouwen heeft 4 tot 6 jaar na de diagnose nog last van vermoeidheid en neuropathie.

Figuur 5: Gevolgen naar tijd

Meer dan **20%** van de vrouwen ervaart **4-6 jaar na diagnose** vermoeidheidsklachten, neuropathie en problemen bij dagelijkse bezigheden



Hulp en ondersteuning

Ervaar je één of meerdere van bovenstaande problemen dan kan je hulp zoeken. Kijk voor meer informatie op [Vind hulp bij kanker](#),

Wil je meer informatie over deze cijfers en de studies? Kijk dan op:

- [IKNL](#)
- [Profielstudie](#)